



ステップ名称		内視鏡的逆行性胆管膵管造影前日	内視鏡的逆行性胆管膵管造影当日	内視鏡的逆行性胆管膵管造影翌日
		1日目	2日目	3日目
目標	ERCP	不安な気持ちを表出でき、検査が受けられる	不安な気持ちを表出でき、検査が受けられる	症状出現時は適切な処置が受けられる
投薬			薬は飲まないで下さい。	
注射・点滴	注射			
	点滴	点滴をします。	点滴をします。	点滴をします。
処置		ペースメーカーが入っている方は申し出てください。	検査後から翌朝まで酸素を行います。 病室に点滴台準備、酸素流量計 鼻から細い管が入る方もいます。	朝の8時に酸素を外します。
検査	検体検査		検査後に採血があります。	採血があります。
	放射線		胆膵内視鏡 (ERCP)	レントゲンのある方もいます。
	他科紹介			
手術				
輸血				
食事			検査前：朝から絶食、検査2時間前まで水分可です。	血液検査の結果で、食事が出ます。 食後に、腹痛・吐き気・黒色便などがありましたら、看護師にお伝えください。
			検査後、採血結果により、水分・内服開始が決まります。	
ケア	安静度		検査には車椅子でレントゲン室に行きます。 検査後、麻酔が効いてふらつくことがあります。ベッド上安静です。 採決結果により安静度が決まります。 トイレに行きたい時は、声をかけて下さい。	採血結果により安静度が決まります。
	清潔 排泄			
指導・同意			金具・ボタンの付いていない下着と病衣を着ていきます。 入れ歯、眼鏡、腕時計、金属類、シップは外して下さい。	観察項目
		スケジュールについて看護師から説明があります。	観察項目	観察項目
		観察項目	観察項目	観察項目
カルテ				

この患者さん用パスは一般的な経過を示しています。患者さんの病状などにより変更・訂正される場合があります。実際に入院される場合には個別にスタッフからの説明があります。